


Туляремия - опасное заболевание, передаваемое грызунами!



Туляремия - это опасное инфекционное заболевание, относящееся к группе природноочаговых инфекций, вызываемое туляремиальным микробом. Основным источником являются больные животные, главным образом грызуны, которые выделяют возбудителя с мочой и испражнениями, загрязняя объекты внешней среды (воду, пищевые продукты, сено, солому, зерно и т.д.). Заражения происходят через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Возбудитель туляремии устойчив во внешней среде. При низкой температуре сохраняется в воде до 2-4 месяцев, в зерне, соломе до 6 месяцев, в пищевых продуктах до 3-х месяцев. Туляремией болеют как сельские, так городские жители.

Основные пути заражения:

- при контакте с грызунами;
- при употреблении воды и пищевых продуктов, загрязненных выделениями грызунов;
- при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля при работе с сеном и зерном, инфицированными больными грызунами;
- при присасывании клещей, зараженных туляремиальным микробом.

Характеристика заболевания

От человека к человеку инфекция не передается. С момента заражения до начала заболевания проходит от 3 до 14 дней. Обычно заболевание начинается остро: озноб, резкое повышение температуры тела до 38-40 градусов, ломота во всем теле, слабость, головная боль, головокружение. Часто при туляремии увеличиваются подчелюстные, подмышечные, паховые лимфатические узлы - бубоны, которые достигают размера голубинового, гусиного яйца. Они очень медленно рассасываются или через 2-3 недели нагнаиваются и вскрываются, образуя долго незаживающий свищ. У некоторых больных может быть ангина, поражение глаз, очаговые

воспалительные процессы в легких. Туляремия может протекать длительно до 1-2 месяцев, но заканчивается выздоровлением.

Меры по профилактике туляремии

Основное средство защиты людей - проведение профилактических прививок, в первую очередь сельским жителям, начиная с 7 лет, а также лицам, подвергающимся высокому риску заражения при осуществлении профессиональной деятельности (перевозка и хранение кормов, зерна, уход за сельскохозяйственными животными). Прививки проводятся 1 раз в 5 лет накожным способом.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУЛЯРЕМИЕЙ?

Проводить на регулярной плановой основе дератизационные и дезинсекционные мероприятия на объектах.

Использовать защитную одежду и репелленты для защиты от кровососущих насекомых и клещей.

Использовать средства защиты органов дыхания и рук при уборке помещений со следами жизнедеятельности грызунов, при работах по переработке зерна, перекладке сена, соломы возможно контаминированных выделениями грызунов.

Использовать средства защиты рук при разделке диких животных, в том числе зайцев.

Соблюдая эти простые правила, Вы можете защитить себя и своих близких от опасного заболевания - туляремии.